



Lymphogranuloma venereum

Informationsblatt für Betroffene

Lymphogranuloma venereum in Stichworten

- ◆ Lymphogranuloma venereum (LGV) ist eine sexuell übertragbare Infektion
- ◆ In Europa treten beinahe alle dokumentierten Fälle bei Männern, welche Sex mit Männern haben (MSM) auf
- ◆ LGV wird beim Sex von einer auf die andere Person übertragen
- ◆ LGV verursacht oft keine Symptome
- ◆ Die Therapie ist einfach
- ◆ Wenn ein LGV nicht behandelt wird, kann es zu ernststen langfristigen Problemen kommen

Was ist ein Lymphogranuloma venerum?

- ❖ Das Lymphogranuloma venereum (LGV) ist eine sexuell übertragbare Infektion. Die Infektion wird durch ein Bakterium namens *Chlamydia trachomatis* L1- L3 verursacht. (Dies ist ein anderer Stamm als der Typ, der Chlamydieninfektionen verursacht).

Wie bekommt man LGV?

- ❖ Sie können sich mit LGV anstecken, wenn Sie Sex mit jemandem haben, der bereits infiziert ist. Dies kann durch Analsex, Fisten, gemeinsames Sexspielzeug und selten durch Oralsex geschehen.
- ❖ Fast alle LGV-Fälle in Europa treten bei Männern auf, die Sex mit Männern haben (MSM), insbesondere wenn sie HIV-positiv sind.
- ❖ Männer, die mehrere Partner haben und Sex an öffentlichen Orten wie Saunas haben, sind am meisten gefährdet.
- ❖ Auch wenn Sie schon einmal an LGV erkrankt waren, können Sie sich erneut anstecken

Was sind die Symptome einer LGV?

- ❖ Eine LGV kann keine Symptome verursachen
- ❖ Die häufigsten Symptome sind Schmerzen im Enddarm, blutiger rektaler Ausfluss,
- ❖ Verstopfung und das Gefühl einer unvollständigen Darmentleerung (Tenesmus).
- ❖ Im Genital- oder Rektalbereich kann sich eine kleine schmerzlose Pustel bilden, aus der sich ein Geschwür entwickeln kann. Dieses heilt innerhalb weniger Tage ohne Behandlung ab. Möglicherweise bemerken Sie einen Ausfluss aus Ihrem Penis oder dem Rektum.



Lymphogranuloma venereum

Informationsblatt für Betroffene

- ❖ 2 bis 6 Wochen später können Sie geschwollene Lymphknoten in der Leiste bekommen, die sich zu einem Abszess entwickeln können und Eiter absondern. Geschwollene Lymphknoten im Unterleib können Unterleibsschmerzen oder Schmerzen im unteren Rücken verursachen.
- ❖ Sie können gleichzeitig Fieber, Schüttelfrost, Unwohlsein, Muskel- und Gelenkschmerzen bemerken.

Benötige ich irgendwelche Tests?

- ❖ Wenn Sie ein Mann sind, der Analverkehr mit anderen Männern hat, oder wenn Sie Symptome haben, die auf eine LGV hindeuten, benötigen Sie einen Abstrich dem Genitalbereich und/oder dem Rektum, um die Diagnose zu stellen.
- ❖ Wenn Sie glauben, dass Sie mit LGV oder anderen Infektionen in Kontakt gekommen sind oder Symptome haben, die auf LGV hindeuten könnten, sollten Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin aufsuchen.
- ❖ Der Arzt oder eine spezialisierte Krankenschwester entnimmt einen Abstrich (Probe) von einem Geschwür im Genitalbereich und/oder dem Rektum bei Männern, die Analverkehr haben, und schickt diesen an ein Labor, wo der Abstrich auf die Bakterien untersucht wird, die LGV verursachen. Wenn Sie geschwollene Lymphknoten haben, kann von diesen eine Probe entnommen werden.
- ❖ Wenn Sie LGV haben, sollten Sie auch auf andere sexuell übertragbare Infektionen wie HIV, Syphilis und Gonorrhö getestet werden, da Sie mehr als eine Infektion gleichzeitig haben können.

Wie wird Lymphogranuloma venereum behandelt?

- ❖ Es ist wichtig, LGV so schnell wie möglich zu behandeln, da die Infektion unbehandelt zu Komplikationen und ernsten gesundheitlichen Problemen führen kann.
- ❖ LGV wird mit einer dreiwöchigen Behandlung mit Antibiotika, in der Regel Doxycyclin oder Erythromycin, behandelt.

Sollte ich Sex haben, wenn ich LGV habe?

- ❖ Sie sollten jeglichen Geschlechtsverkehr vermeiden, auch mit Kondom, bis Sie und Ihr Partner die Behandlung abgeschlossen haben und Ihre Symptome verschwunden sind.



Lymphogranuloma venereum

Informationsblatt für Betroffene

Was sind die möglichen Komplikationen von LGV?

- ❖ Es ist unwahrscheinlich, dass LGV zu langfristigen Problemen führt, wenn sie schnell behandelt wird. Ohne Behandlung kann sich die LGV jedoch auf andere Teile des Körpers ausbreiten und ernsthafte Probleme wie Arthritis, oder Leberprobleme verursachen. In seltenen Fällen verursacht sie eine Entzündung des Herzens oder des Gehirns.
- ❖ Ohne Behandlung kann sie schließlich zu Entzündungen im Rektal- und Genitalbereich mit starken Schwellungen und Geschwüren führen, die langfristige Schmerzen und Darmprobleme verursachen.

Muss ich meinem Partner davon erzählen?

- ❖ Wenn Sie LGV haben, ist es wichtig, dass Ihr aktueller Sexualpartner und jeder andere Sexualpartner, den Sie in den letzten drei Monaten hatten, getestet und behandelt wird
- ❖ Dies soll verhindern, dass Sie sich erneut anstecken, und auch, dass Ihre Partner Komplikationen entwickeln.

Weitere Hilfe und Information

- ❖ Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie eine LGV oder eine andere sexuell übertragbare Infektion haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin.